Calmeria

Vass7R12s511-515



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp175

Se de la serie de

-Calméria 10 R80-371-375



ulantanlantanlantanlantanl





ANNEE: 1993

NOM Calméria EMPLACEMENT 10R8s-371.375
Bulg. 59.76

	1				,							
uche	Nbre yeux	Débou début	rrement mi/déb	Nbre	Ferti- Floraison début mi/f fin				Véraison début mi/v fin			Maturité
	-	pr		2		40040	2111/1	+ + 11	aebut	1111/V	T T11	
1 {	4	16,3	i8.3,	0					<i>></i>			
3 4 5 5	t Da	18.3 · -2	3 3		Grappe Pour: Baie: Couleu: Saveur Pépins Port:	TG - () disc-s r : B-() : s -	Mil G - M sph-el Gr-Rs-: m - a	l: - P D: 1-ov-c Rg-N r - fc yrène	im : obov-cy Jus	vl-fus : inc		L - M -C
	33 M	300000		- The second								

	ANNEX: 1994 NOM Calmeria EMPLACEMENT NO R8 1371.375 Bulg 57.76											
Souche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- litő		Floraison lebut mi/f fin			raison mi/v	fin	Maturit é
X 2 X X X	3	28.2.	28 2	0	Pour : Baie : Couleur Saveur Pépins	TC - 0 disc-sp r : B-0 : s -	Mil G - M Dh-ell Gr-Rs- m - a	l: - P L -ov-ok Rg-N r - fo	oov-cyl Jus : ox - he	l-fus inc -		: L - M- C
	7 00	V1/3	>		Fort:		,	Vı	gueur			

ANNEE: 1995

NOM Calmeria (mi)

EMPLACEMENT NO R8 & 371, 375

ouche	Nbre yeux				Ferti- lité		Véraison début mi/v fin			Maturit é					
	YCUA	reput	ma/ deb	grap	TILE	Cenut	mi/f	rin	debut	m1/v	tin				
1 }	4	6.3	13,3	0											
Grappe: G - M - P Dim: Compacit										cité:	L - M -C				
5 }					Baie: TG - G - M - P Dim:										
0						disc-s	ph-ell	1-0v-c	bov-cy	l-fus					
					Couleur	: B-G	r-Rs-F	g-'n	Jus	: inc	- co	loré			
	1	12 2	0//11		Saveur	: s -	m - a1	- fc	x - he	rb					
	20 4	13.3	25(-4)		Pépins	: avec	- apy	rène							
		,			Fort: Meng. Vigueur: 2										

	1	<u> </u>												
ANU	NOM Calmeria (M) EMPLACEMENT NO R8 & 371.375													
MCI	1 Cal	meria			EMPLACEMENT NO R8 & 371.375									
Bul	g.57.	76												
uche	Nbre yeux	Débout début	rrement mi/déb	Ubre grap	Ferti- lité		mi/f	fin		mi/v	fin	Maturité		
	2	70												
2	3	11.3	18 3.	0										
3	F				Grappe	: G -	M - P	Dim	:	Compa	cité	: L - 11 -C		
d.	17				Pour :	TG -	Mil		im :					
5	4					disc-	sph-el	1-ov-	obov-c	yl-fus				
	D le	18.3.	36 (+2)		Coulev	<u>ir</u> : P-	Gr-Rs-	Rg-N	Jus or - b	: inc	- C	oloré		
						: s - s : ave				erp				
		,	-		Fort				/igueur	:				

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Calméria 10 R8 s- 371-375 + 2

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198)

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212)- autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 /- séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre 234) - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

- Calver 92

Nº d'ordre :

Désignation :

Calméria 10 R8 s. 371-375 s. 2

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

dantanlaataalaataalaataal

A contour uni - anguleux - côtélé. Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289. Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

: <u>dos</u> coloré 254 - à raies 255 - vert 256. Noeuds

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

: verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

: coloré 264 - vert 265. Bourgeon

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

-Calvo 92

N° d'ordre :

Désignation :

Calméria 10 R8 s - 371-375 s.2

dantadantadantadantad

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142/- grande 143.

partiellement - totalement.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

limbe : glabre 150/- séteux 151 - velouté 152 aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 1(71) - court 172. Glabre 1/73 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 sillon - partiellement - totalement. Coloré 176 - partiellement coloré 177 vert 178. Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.

Formulaire de description 5/8

<u>dantanlaataalaataalaataal</u>

(maturité) Année: 1999 Observateur Code cépage Code clone Emplacement: 10 R 8 & 3 71 375 Nom cépage: Calmeria Grappe oiv 202 longueur : très courte (<10cm) 1 - courte (10-15cm) 3 - moyenne (15-20cm) (5)- longue (20-30cm) 7 - très longue (>30cm) 9. oiv 203 largeur: très étroite (<5cm) 1 - étroite (5-10cm) 3 - moyenne (10-15cm)(5) large (15-20cm)(7) très large (>20cm) 9. oiv 204 compacité : très lâche 1 - lâche 3 - moyenne 5 - compacte 2 très compacte 9 Div 206 longueur pédoncule : très court (<2cm) 1 - court (2-4cm) 3- moyen (4-7cm) 5 - long (7-10cm) 7 - très long (>10cm) 9. oiv 207 lignification du pédoncule : base seulement 1 - moitié 5 - plus de la moitié 7.) oiv 208* forme : cylindrique 1 - conique ou pyramidale(2) oiv 209* présence d'un aileron : absent/\(\gamma\) - une aile 2 - deux ailes 3 - plus de deux ailes 4 Baie oiv 220 longueur: très courte (<8mm) 1 - courte (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5 - longue (20-26mm) 7 - très longue (>26mm)(9) oiv 221 largeur: très étroite (<8mm) 1 - étroite (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5 - large (20-26mm (7) très large (>26mm) 9. oiv 222 uniformité de la grosseur : non uniforme 1 - uniforme 3. oiv 223 forme: aplatie 1 - arrondie 2 - elliptique 3 - ovoïde 4 - troncovoïde 5 - obovoïde 6 ylindrique 7 - arquée 8. oiv 225 couleur épiderme : vert jaune D-rose 2 - rouge 3 - gris 4 - rouge violet 5 - bleu noir 6. oiv 226 **uniformité couleur épiderme** : non uniforme 1 - uniforme 2.) oiv 227 pruine : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 228 épaisseur pellicule : très mince 1 - mince 3 - moyenne 5 - épaisse 7 - tres épaisse 9. région ombilicale deprimée oiv 229 ombilic: peu apparent(1) apparent 2. oiv 230* coloration de la pulpe : non coloré D colorée 2. oiv 231 intensité coloration pulpe : non coloree 1)- coloration faible 3 - coloration moyenne 5 forte coloration 7 - très forte coloration 9. oiv 232 succulence pulpe : peu juteuse 1) juteuse 2. oiv 233 rendement en jus (ml / 100g baies) : faible (<65) 3 - moyen (65-75) 5 - élevé (>75) 7. oiv 235 **fermeté pulpe** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - élevée 7 - très élevée 9.) oiv 236 saveur : aucune D- goût muscat 2 - goût foxé 3 - goût herbacé 4 - goût spécial 5 oiv 236* saveur : aucune 1) goût muscat 2 - goût foxé 3 - autre 4. oiv 238 longueur pédicelle : très court (<4mm) 1 - court (4-8mm) 3 - moyen (8-12mm) 5)- long (12-16mm) 7 - très long (>16mm) 9. oiv 240 séparation du pédicelle : très facile 1 - facile 3 - moyen 5 - difficile 7 - très difficile 9. oiv 241 présence de pépins : absents type corinthien 1 - rudimentaires type sultanien 2 - présents 3. oiv 242 longueur pépins : très courts 1 - courts 3 - moyens 5 longs 7 - très longs 9. oiv 243 poids d'un pépin (moyenne de 100 pépins secs) : très faible (<10mg) 1 - faible (25mg) 3 moyen (40mg) 5 - élevé (55mg) 7 - très élevé (>65mg) 9.

Vassal grappe : axe de la rafle : non coloré(81) coloré 80.

oiv 244 cannelures transversales face dorsale pépins : absentes(1) présentes 2

Formulaire de description 6/8

(après chute des feuilles)

Année:

2000

Observateur: TD

Code cépage Nom cépage : Calmeria Code clone

Emplacement: 10 R81371-375

Sarment

oiv 101 section transversale : circulaire 1 - elliptique 3 - aplatie 5

oiv 102 surface : unie 1 - côtelée 2 - striée 3

oiv 103 couleur générale : jaune D- brunâtre 2 - rouge violacé 3 - gris 4.

oiv 104 lenticelles : absentes 1 - présentes 9

oiv 105 densité des poils dressés des noeuds : absence 1)- présence 9.

oiv 106 densité des poils dressés des entrenoeuds : absence 1 - présence 9.

oiv 353 longueur entrenoeuds: très courts (<60mm) 1 - courts (90mm) 32 moyens (120mm) 5 -

longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9.

oiv 354 diamètre entrenoeuds: très petit (<5mm) 1 - petit (8mm) 3 - moyen (11mm) 5 - grand

(14mm) 7 - très grand (>17mm) 9.

Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha: très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 553 aptitude à la rhizogenèse : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

Vassal:

Noeuds: aplatis 1 - moyens 2 - saillants 3.